

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR PATIENTEN

### Enterolin®-Tropfen

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihr Kind nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlt, suchen Sie mit Ihrem Kind einen Arzt auf.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Enterolin und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Enterolin beachten?
3. Wie ist Enterolin anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Enterolin aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. WAS IST Enterolin UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Enterolin ist ein homöopathisches Arzneimittel.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

Koliken und Blähungen bei Kindern von 2 Wochen bis 6 Jahren.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn sich Ihr Kind nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlt, suchen Sie mit Ihrem Kind einen Arzt auf.

#### **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Enterolin BEACHTEN?**

**Enterolin darf nicht angewendet werden,**

- wenn Ihr Kind allergisch gegen *Matricaria recutita*, *Artemisia cina*, oder andere Korbblütler, *Citrullus colocynthis*, *Lac bovinum defloratum*, *Magnesium chloratum* oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels ist.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Enterolin bei Ihrem Kind anwenden.

Bei Auftreten von hohem Fieber oder starken Durchfällen muss ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Einnahme homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Solche Reaktionen sind zumeist harmlos. Sollten sich die Beschwerden nicht bessern, dann ist das Arzneimittel abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittelprüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

Die Anwendung bei Kindern von 2 Wochen bis 2 Monaten darf nur auf ärztliche Empfehlung erfolgen

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung von Enterolin bei Kindern unter 2 Wochen nicht empfohlen werden.

#### **Anwendung von Enterolin zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn das Kind andere Arzneimittel einnimmt / anwendet, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet hat oder Sie beabsichtigen Ihrem Kind andere Arzneimittel zu geben.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

#### **Anwendung von Enterolin zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Enterolin ist nicht zur Einnahme durch Erwachsene bestimmt.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Enterolin hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

#### **Enterolin enthält Alkohol**

Dieses Arzneimittel enthält geringe Mengen an Ethanol (Alkohol), weniger als 100mg pro Dosis.

### **3. WIE IST Enterolin ANZUWENDEN?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Kinder von 2 Wochen bis 6 Jahren:

Bei akuten Beschwerden: 3 Tropfen pro Stunde maximal 6-mal täglich.

Zur nachfolgenden Behandlung: 3-mal täglich 3 Tropfen.

Die Anwendung bei Kindern von 2 Wochen bis 2 Monaten darf nur auf ärztliche Empfehlung erfolgen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung von Enterolin bei Kindern unter 2 Wochen nicht empfohlen werden.

Zum Einnehmen.

Da die Mundschleimhaut als sogenannte Erstreaktionsfläche dient, empfiehlt es sich, die Tropfen nicht sofort zu schlucken.

Die Tropfen können mit etwas Wasser (ca. 50 ml) verdünnt angewendet werden.

Die Einnahme sollte 1/2 Stunde vor der Mahlzeit erfolgen.

Wenn sich Ihr Kind nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlt, suchen Sie mit Ihrem Kind einen Arzt auf.

**Wenn Sie eine größere Menge von Enterolin angewendet haben, als Sie sollten**

Bisher wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

**Wenn Sie die Anwendung von Enterolin vergessen haben**

geben Sie dem Kind nicht die doppelte Menge, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind bei der Einnahme von Enterolin keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. WIE IST Enterolin AUFZUBEWAHREN?**

Für das ungeöffnete Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Nach dem ersten Öffnen nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach „Verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen: 12 Monate

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Enterolin enthält**

Die Wirkstoffe in 100 g sind:

Matricaria recutita Dil. D5 1g, Artemisia cina Dil. D5 1g, Citrullus colocynthis Dil. D5 1g, Lac bovinum defloratum Dil. D5 1g, Magnesium chloratum Dil. D5 1g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol (Gesamtalkoholgehalt ca. 2,1 Gew.-%), Xylitol, Glycerol 85%, Gereinigtes Wasser

### **Wie Enterolin aussieht und Inhalt der Packung**

Enterolin sind farblose, klare, viskose Tropfen zum Einnehmen in Glasflaschen mit Tropfeinsatz und Schraubverschluss aus Kunststoff.

Packungsgröße: 20ml

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Zulassungsinhaber:

Pharmazeutischer Unternehmer:

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe  
Deutschland

Hersteller:

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe  
Deutschland

oder

Dr. Peithner KG nunmehr GmbH & Co  
Richard Strauss-Straße 13  
1230 Wien  
Tel: +43 (1) 616 26 44 - 64  
Fax-Nr.: + 43 (1) 616 26 44 - 851  
E-mail: [med.service@peithner.at](mailto:med.service@peithner.at)

**Z. Nr.:** 336189

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2015.**